

O que é o glaucoma

Glaucoma é um grupo de doenças oculares que compartilha a característica comum do dano ao nervo óptico. Se não for tratado, o glaucoma pode levar à perda gradual da visão.

Na maioria dos tipos de glaucoma, a pressão intra-ocular é elevada; entretanto, o glaucoma pode manifestar-se sem que haja aumento da pressão intra-ocular.



Conviva melhor com o glaucoma

- 👁️ Use o medicamento de acordo com as instruções do médico.
- 👁️ Informe ao seu oftalmologista se está usando outros medicamentos, especialmente aqueles comprados sem receita. E, se consultar outro médico, não deixe de informá-lo de que está sendo tratado do glaucoma.
- 👁️ Nunca use outro medicamento ou colírio sem autorização médica.
- 👁️ O glaucoma pode ser hereditário; por isso, recomende a todos os adultos de sua família –inclusive tios e primos– que façam um exame oftalmológico periódico.
- 👁️ O controle do glaucoma depende de você. Se o glaucoma for tratado da forma correta, praticamente não haverá riscos de perda da visão.

Recomendações para usar o colírio

- Leia a bula que acompanha o medicamento e siga corretamente as instruções.
- Lave as mãos antes de aplicar o colírio.
- Tenha o cuidado de não tocar o olho ou os cílios com a ponta do aplicador.
- Se for aplicar diferentes tipos de colírio no mesmo olho, espere pelo menos dez minutos entre a aplicação dos colírios para que a segunda gota não elimine a primeira.
- Você perceberá que a medicação atinge seu olho adequadamente. Caso isso não aconteça, coloque mais uma gota.
- Mantenha os olhos fechados durante 1 a 2 minutos para permitir que a medicação seja absorvida.
- Use um lenço de papel para retirar o excesso de colírio.
- Você pode sentir leve ardência nos olhos, mas a sensação passará em segundos. Não deixe de usar seu colírio por esse motivo.

Quais são os fatores de risco para o glaucoma

- 👁️ Histórico familiar de glaucoma de qualquer tipo
- 👁️ Diabete
- 👁️ Hipertensão
- 👁️ Miopia
- 👁️ Idade avançada



Como utilizar o colírio



Puxe a pálpebra inferior
para formar uma bolsa.



Instile a gota de colírio
dentro da bolsa
formada pela pálpebra.



Pressione levemente o
canto interno do olho
durante 3 minutos para
ocluir o ducto lacrimal.

MC 271/04

01-2005-CST-01-BR-271-PA

 **MERCK SHARP & DOHME**


on line
0800-100222
E-mail: online@merck.com.br
www.madonline.com.br

Dicas úteis sobre o Glaucoma

